



DIEMME ITALIA

ORGAN SPECIAL

N 31

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO (S7)

ALTO CONTENUTO
DI
CARBONIO ORGANICO UMIFICATO
(CARBONIO UMICO E FULVICO)

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti

ORGAN SPECIAL

N 31

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO (S7) con inibitore dell'ureasi (N-(n-butil) triammide tiofosforica (NBPT))

Concime organo-minerale ad **elevato contenuto di azoto**, particolarmente indicato per le esigenze delle colture estensive quali **cereali, mais, girasole** ma anche **fruttiferi, olivo e orticole**.

La matrice organica umificata, reagendo con gli elementi nutritivi, conferisce loro un notevole grado di **protezione dalle perdite** dovute a dilavamento e volatilizzazione, per una **prolungata disponibilità** per tutto il ciclo colturale. L'elevata efficienza nutrizionale consente il **risparmio in unità fertilizzanti** e la **razionalizzazione della tecnica di concimazione** per una maggiore **sostenibilità ambientale**. La presenza di diverse forme di **azoto**, ureico, ureico con inibitore dell'ureasi (NBPT) e organico, permette di ottenere una cessione differenziata e graduale dell'elemento. La presenza di **zolfo**, che agisce in sinergia con l'azoto, migliora la sintesi proteica esaltando la qualità dei raccolti.

TITOLI	
Azoto (N) totale	31%
Azoto (N) organico	1%
Azoto (N) ureico	27,5%
Azoto (N) ureico con inibitore dell'ureasi	2,5%
Anidride solforica (SO ₂) totale	7%
Carbonio (C) organico di origine biologica	8%
Carbonio (C) umico e fulvico	2,5%

• Concimi minerali

Urea, urea con inibitore dell'ureasi (N-(n-butil) triammide tiofosforica (NBPT)).

• Componenti organiche

Letame essiccato, pellicino integrato.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA	DOSE Kg/ha	IMPIEGO
Frumento, riso ed altri cereali	200-400	In fase di accestimento - inizio levata
Mais, sorgo	200-500	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina o in post-emergenza della coltura
Colture industriali, oleaginose e proteiche	100-300	Prima della fase di maggior sviluppo fogliare
Viticultura	100-200	Ad allegazione avvenuta
Olivicoltura	200-300	Ad allegazione avvenuta
Orticoltura	200-300	Prima della fase di maggior sviluppo per le colture a foglia o dopo l'allegazione dei primi frutti
Frutticoltura	300-400	Alla ripresa vegetativa
Floricole, ornamentali e prati ricreativi	200-300	Alla ripresa vegetativa
Barbabietola, colture foraggere	200-300	Prima della fase di maggior sviluppo fogliare
Tabacco	200-300	Prima della fase di maggior sviluppo fogliare

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici ed organo-minerali è auspicabile un leggero interramento per migliorarne l'azione nutrizionale.

Non disperdere la confezione nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

ORGAN SPECIAL N31 Rev. n°8 del 17/03/2021

Approval Number:
Stabilimento di Vidor:
ABP1 193UFERT2
Stabilimento di Arquata del Tronto:
ABP1 177UFERT2

Fabbricante



Unimer S.p.A. - Via F. Turati, 28 - Milano

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =